

Bloedverlies tijdens de partus

Doel

Kraamverzorgende weet te handelen wanneer bloedverlies tijdens de ontsluiting optreedt.

Aandachtspunten

- Door het ontsluitingsproces is er weinig vaginaal bloedverlies. Wanneer er veel vaginaal bloedverlies is, dan is er sprake van een moeilijke situatie, omdat niet altijd duidelijk is wat de oorzaak kan zijn.
- In zeldzame gevallen kan het in plaats van moederlijk zelfs kinderlijk bloed zijn.
- Afhankelijk van de hoeveelheid bloedverlies, de conditie van het kind en de moeder besluit de verloskundige om af te wachten of om toch over te gaan op medisch ingrijpen.

Werkwijze

Uitvoering

- Bel direct de verloskundige, indien vruchtwater niet helder is maar bloed bevat (paar druppels is niet erg);
- Vraag de barende wanneer ze haar kindje voor het laatst heeft gevoeld;
- Houd bij veel bloedverlies de algemene conditie van de barende in de gaten. Let op signalen van shock, snelle weke polsslag, bleke gelaatskleur, verzwakte spiertonus, weinig aanspreekbaar, transpireren, bewustzijnsverlies en koude spitse neus;
- Bewaar maandverband met vruchtwater om de verloskundige te tonen bij aankomst;
- Blijf rustig en ondersteun de barende bij haar weeën, benoem wel waarom je de verloskundige hebt gebeld;
- Tref beschermende maatregelen in verband met vruchtwater- en/of bloedverlies: maandverband geven, slip aandoen of schone celstofonderlegger.

Nazorg

- Ruim gebruikte materialen op, eventueel bloedwas spoelen;
- Vul partusverslag en de temperatuurlijst van het zorgdossier in;
- Neem eventueel contact op met de kraamzorgorganisatie.

Handeling bloedverlies tijdens de partus	Vastgesteld d.d.: 01-05-2021
Documenteigenaar: KCKZ	Evaluatie d.d.: 01-05-2022
Versie: 3.1	Pagina 1 van 1